



- حدوث نقص عارض "لمدة ثواني" في نسبة الأكسجين عند إعطاء المسكن يتم السيطرة عليه بزيادة الأكسجين.
- حدوث ثقب في الامعاء قد يستدعي إجراء عملية جراحية عاجلة وذلك في حالات نادرة جداً.
- عند ارتفاع درجة الحرارة بعد الفحص، أو وجود آلام شديدة في الصدر أو البطن مصحوباً بالقيء، أو النزيف الشرجي فعليك الاتصال بالطبيب المعالج والتوجه إلى أقرب مستشفى.

#### بعد إجراء المنظار

- يبقى المريض تحت المراقبة لمدة 2 - 4 ساعات حسب ما يراه الطبيب ولن يسمح لك بقيادة السيارة طوال اليوم حتى لو لم تكن تشعر بالتعب.
- قد تشعر بألم بسيط في البطن، وانتفاخ في البطن بسبب ضخ الهواء أثناء عملية التنظير.
- يمكنك تناول الطعام بعد الفحص بساعتين إلى أربع ساعات وذلك بعد زوال آثار التخدير تماماً.
- سيقوم الطبيب بإخبارك بنتيجة الفحص في نفس اليوم، وفي حال أخذ عينة لفحصها مخبرياً فإن النتائج قد تستغرق أسبوعاً.



#### ما هي المضاعفات الوارد حدوثها من منظار القولون؟

بالرغم من أن المضاعفات واردة إلا أنها نادرة الحدوث جداً إذا قام بإجراء المنظار أطباء مؤهلون وذوي خبرة في هذا المجال ومنها:

- في حالات نادرة قد يحدث نزيف من مكان اخذ العينة أو الزوائد اللحمية التي تمت إزالتها.

# SGA

SAUDI  
GASTROENTEROLOGY  
ASSOCIATION

الجمعية السعودية  
للجهاز الهضمي

مع تمنياتنا لكم بدوام الصحة والعافية  
إعداد الجمعية السعودية للجهاز الهضمي

حقوق الطبع والنشر محفوظة للجمعية السعودية للجهاز الهضمي  
الطبعة الثانية - ١٤٣٢ هـ / ٢٠١١ م  
www.saudigastro.com

منظار القولون  
Colonoscopy



1. ألم البطن الحاد أو المزمن.
2. خروج الدم مع البراز أو اسوداد لون البراز؛ مما يدل على وجود نزيف من الجهاز الهضمي.
3. الإسهال أو الإمساك المزمن.
4. نقص الوزن الحاد.
5. فقر الدم.
6. تقييم الالتهابات والأورام والمساعدة في معرفة ما إذا كانت خبيثة أو حميدة.
7. التهابات القولون التقرحية وتقييم شدتها.
8. اخذ عينات لأسباب مختلفة حسب ما يراه الطبيب .
9. كما يمكن إجراء بعض العمليات البسيطة والسريعة مثل إزالة الزوائد اللحمية ووضع دعائم القولون لمعالجة الانسداد وغيرها.

- يجب على المريض إخبار الطبيب عن أي التهابات مزمنة في صمامات القلب؛ وذلك لإعطائه المضاد الحيوي المناسب قبل إجراء المنظار .
- إتباع التعليمات الخاصة بتحضير القولون بدقة.
- ستعطى جرعة مهدئة ومسكنة للألم عن طريق الوريد أثناء الفحص مما يستلزم بقائك في وحدة المناظير من ساعتين إلى ثلاث ساعات.
- لا يسمح لك بقيادة السيارة في هذا اليوم لذا عليك إحضار مرافق ليقوم بهذه المهمة.

المنظار هو عبارة عن أنبوب صغير اسطواني الشكل، في نهايته كاميرا صغيرة تنقل الصورة إلى شاشة تلفزيونية يتم من خلالها رؤية الأجزاء الداخلية من الجهاز الهضمي.

يستخدم المنظار في تشخيص وعلاج الكثير من أمراض الجهاز الهضمي مثل الالتهابات والتقرحات والأورام ويعتبر أكثر دقة من الأشعة في اكتشاف مثل هذه الأمراض.

#### منظار القولون؛

يسمح منظار القولون بفحص الغشاء المخاطي للأمعاء الغليظة وذلك من خلال أنبوب مرن يدخل من فتحة الشرج وصولاً إلى نقطة التقاء الأمعاء الغليظة بالأمعاء الدقيقة ويستغرق هذا الفحص عادة ما بين 15 إلى 30 دقيقة ولا يتطلب بقاء المريض في المستشفى.

#### ما هي دواعي منظار القولون؟

يساعد منظار القولون في تقييم وتشخيص بعض الأعراض التي تصيب الجهاز الهضمي وكذلك في علاج بعضها ومنها:



#### ماذا يجب عليك قبل المنظار؟

- إجراء بعض التحاليل اللازمة والمطلوبة من الطبيب المعالج.
- التوقيع على الموافقة على إجراء المنظار بعد شرح عملية التنظير من قبل الطاقم الطبي.
- يجب على المريض إحاطة الممرضة أو الطبيب في حالة تناوله للأدوية التي تتعارض مع الإجراء للعملية مثل عقار الأسبرين والأدوية المسيلة للدم وعند وجود حساسية تجاه أدوية معينة.

#### التحضير اللازم لعمل تنظير القولون:

لكي تحصل على أفضل النتائج؛ يجب عليك اتباع التعليمات الخاصة بتحضير القولون والتي تتضمن عدم الأكل وتناول سوائل صافية فقط لمدة 24 ساعة قبل المنظار و تناول محلول مسهل خاص لتنظيف القولون في اليوم السابق للمنظار حسب إرشادات الطبيب.

#### يوم إجراء الفحص:

- ستعطى ملابس خاصة لارتدائها.
- سيطلب منك الاستلقاء على جانبك الأيسر في السرير ثم تقوم الممرضة بإعطائك المهدئ والمسكن حسب تعليمات الطبيب.
- أثناء المنظار ستشعر بانتفاخ في البطن ناتج من الهواء الخارج من المنظار والذي يضخه الطبيب كي يتسنى له رؤية جدران القولون بوضوح.